

Einführung in die Verhaltensanalyse **Klassisches Konditionieren** Wiederholung

1. _____ sind automatische, beliebig wiederholbare, zweckgerichtete Antworten auf Reize.
2. Beim klassischen Konditionieren wird ein _____ Reiz (Abkürzung NS) mehrfach mit einem _____ Reiz (Abkürzung UCS), der eine _____ Reaktion (Abkürzung UCR) auslöst, gepaart.
3. Anschließend genügt dieser neutrale Reiz, der jetzt _____ Reiz (Abkürzung CS) genannt wird, um die (nunmehr) _____ Reaktion (Abkürzung CR) auszulösen.
4. Der Ton der Glocke in Pawlows Experiment ist (am Ende des Experiments) ein _____ (Abkürzung _____).
5. Ordnen Sie die richtigen Begriffe zu (Abkürzungen verwenden):
Kinder, die mit der Flasche gefüttert werden, beginnen mit Saugbewegungen (____), wenn sie einen Schnuller (____) sehen. Ein Summton (____) löst dagegen keine Reaktion aus. Wird aber der Summton mehrfach mit der Präsentation des Schnullers gekoppelt, so genügt am Ende der Summton (____) allein, um die Saugbewegung (____) auszulösen.
6. Alle unbedingten Reaktionen sind auch konditionierbar. (Richtig / Falsch)
7. Unbedingte Reaktion und die bedingte Reaktion sind nicht identisch. (Richtig / Falsch)